



EDYPRO
biotecnologia



**Aumentare la produzione e la qualità
della coltivazione di PATATA DOLCE
attraverso la BIOTECNOLOGIA**



Trapianto e Radicazione nel campo

Applicazioni Radicolari

EDYPRO HUMECTANTE nella 1^a irrigazione **20 L./ha.**

ENRAIZANTE ESPECIAL nella 2^a irrigazione **10 L./ha.**

e ripetere dopo 8 giorni a **5 L./ha.**

COUPÉ REGENERACIÓN Plus nella 4^a irrigazione **40 L./ha.**

e ripetere dopo 20 giorni a **60 L./ha.**



EDYPRO
biotecnologia



1° Trattamento di Induzione alla Produzione

Applicazione Fogliare

Eseguire 50-60 giorni dal trapianto

FECUNDATOR

4 L. x 1000 L.

CA-FRUIT

3 L. x 1000 L.

ALGATRON

3 L. x 1000 L.

ULTRAMAN

2,5 L. x 1000 L.

MELASTOP

1,5 L. x 1000 L.

Volume di brodo: 400 L./ha.



EDYPRO
biotecnologia



2° rattamento di Induzione alla Produzione

Applicazione Fogliare

Eseguire 6 giorni dopo il trattamento precedente

| | |
|-------------------|-------------------------|
| FECUNDATOR | 4 L. / 1000 L. |
| CA-FRUIT | 3 L. / 1000 L. |
| ALGATRON | 3 L. / 1000 L. |
| ULTRAMAN | 2,5 L. / 1000 L. |
| MELASTOP | 1,5 L. / 1000 L. |

Volume di brodo: 500 L./ha.



Trattamento di stimolazione radicolare

Applicazione Radicolare

Eseguire 50-60 giorni dal trapianto:

ORGANOVITAL PLUS

40 L. / ha.

Applicare in un'unica irrigazione senza mescolare con fertilizzanti.



3° rattamento di Induzione alla Produzione

Applicazione Fogliare

Eeguire 6 giorni dopo il trattamento precedente

| | |
|-------------------|-------------------------|
| FECUNDATOR | 2,5 L. / 1000 L. |
| CA-FRUIT | 3 L. / 1000 L. |
| ENDOFOSTEC | 4 L. / 1000 L. |
| ULTRAMAN | 2 L. / 1000 L. |
| MELASTOP | 1,5 L. / 1000 L. |

Volumen de caldo: 600 L./ha.



1° Trattamento di Accrescimento del Bulbo **Applicazione Fogliare**

Eeguire 6 giorni dopo il trattamento precedente

| | |
|--------------------|-------------------------|
| MAX QUALITY | 4 L. / 1000 L. |
| CA-FRUIT | 2 L. / 1000 L. |
| ULTRAZINC | 2,5 L. / 1000 L. |
| EDYMAG | 2,5 L. / 1000 L. |
| MELASTOP | 1,5 L. / 1000 L. |

Volume de caldo: 600 L./ha.



2° Trattamento di Accrescimento del Bulbo

Applicazione Fogliare

Eseguire 6 giorni dopo il trattamento precedente

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| MAX QUALITY | 4 L. / 1000 L. |
| EDYMAG | 2,5 L. / 1000 L. |
| MADUR FRUIT FOLIAR | 4 L. / 1000 L. |
| MELASTOP | 1,5 L. / 1000 L. |

Volume di brodo: 700 L./ha.



EDYPRO
biotecnologia



3° Trattamento

di Accrescimento del Bulbo

Applicazione Fogliare

Eseguire 6 giorni dopo il trattamento precedente

MADUR FRUIT FOLIAR **4 L. / 1000 L.**

CA-FRUIT **2 L. / 1000 L.**

ENDOFOSTEC **4 L. / 1000 L.**

EDYMAG **2 L. / 1000 L.**

MELASTOP **1,5 L. / 1000 L.**

Volume di brodo: 800 L./ha.