



EDYPRO
biotecnología



**Incrementa la producción y
la calidad en el cultivo de
TOMATE
mediante la BIOTECNOLOGÍA**



Este tratamiento esta recomendado para disponer de un suelo activo, equilibrado y con alto intercambio catiónico.

Tratamiento de Activación Prebiótica, Pre – plantación

Aplicación Radicular
COUPÉ REGENERACIÓN Plus

160 – 200 L. / ha.

Divididos en 2 aplicaciones



EDYPRO
biotecnología

Tratamiento Radicular de Preparación de Bulbo de Goteo

EDYPRO HUMECTANTE

20 L./ha. en un solo riego largo de pre-trasplante, repartido de la primera a la última gota.





Este tratamiento está recomendado para un rápido enraizamiento que permite a la planta superar, con menores pérdidas posibles, el estrés de trasplante.

Tratamiento de Post- trasplante y enraizamiento

Aplicación Foliar

ENDOFOSTEC

300 c.c. x 100 L.

ALGATRON

200 c.c. x 100 L.

REVOLUTION

500 c.c. x 100 L.

ACTIVACIÓN RADICULAR:

Durante el ciclo de cultivo:

ENRAIZANTE ESPECIAL 5 L. / ha.

Si se asocia con 40 L./ha. COUPÉ REGENERACIÓN Plus la sinergia mejora su eficacia de modo destacado y “explosivo”.



Este tratamiento ayudará a la planta tomar un ritmo de desarrollo vegetativo equilibrado, que es la base necesaria para una alta actividad productiva.

Tratamiento de Desarrollo Vegetativo

Aplicación Foliar

ALGATRON	200 c.c. x 100 L.
CENICIENTA	300 c.c. x 100 L.
REVOLUTION	500 c.c. x 100 L.
MELASTOP	200 c.c. x 100 L.



Aplicaciones para obtener unos niveles óptimos de polen fértil.

Aplicación Radicular

EDYFOS

5 L. / ha. y semana

Mantener las aplicaciones durante el periodo de floración y cuajado.



Este tratamiento está recomendado para facilitar el cuajado, evitar caída prematura de los frutos y de este modo incrementar el rendimiento del cultivo.

Tratamiento de Cuajado

Aplicación Radicular

-1ª aplicación, en el momento de aparición del primer ramo

floral: COUPÉ REGENERACIÓN Plus 60 L. / ha.

-2ª: A los 3- 4 días de la 1ª aplicación:

PROCUAJE RADICULAR a 15 L. / ha.

-3ª y siguientes aplicaciones:

- PROCUAJE RADICULAR a 15 L. / ha. cada 7 días



Aplicar desde el inicio de la fase de engrosamiento para conseguir un calibre uniforme, frutos con densidad y consistencia óptima.

Tratamiento de Engorde

Aplicación Radicular

CA-FRUIT

20 L. / ha. cada semana

EDYFRUIT ENGORDE RADICULAR

15 L. / ha. cada semana

HORTIGROS

De 10 a 15 L. / ha. cada semana



Tratamiento para aplicar al principio de la fase de maduración para conseguir una coloración más rápida y uniforme de los frutos. Para conseguir una maduración continuada, aplicar cada 7 días.

Tratamiento de Maduración

Aplicación Radicular

MADUR FRUIT RADICULAR

- **1ª aplicación: 20 L. / ha.**
- **2ª aplicación y posteriores: 10 L. / ha.**
(Pudiendo llegar a los 20 L. / ha. en caso de necesidad extrema)



EDYPRO
biotecnología

