EDYPRO
biotecnologia

Aumenta la produzione e migliora la qualità di Vigneto con l'uso della BIOTECNOLOGÍA

Assimilazione dei nutrienti del suolo

COÚPÉ REGENERACIÓN Plus

Applicazione radicolare

1ª applicazione: da **60 a 80 L./ha.**, nei primi giorni di primavera, all'inizio dell'attività vegetativa.

All'inizio del'accrescimento e nei momenti di sovraffaticamento: applicazioni da **60 a 80 L./ha.** migliorano l'allegagione e l'accrescimento in modo importante.

EDYPRO
biotecnologia

FECUNDATOR corregge il comportamento vegetativo generato dallo *"spostamento del fiore nel grappolo"*. Aumenta la produzione, riducendo al minimo il numero di frutti abortiti.

1º Trattamento per l'Allegagione

Quando il fiore inizia ad aprirsi

Applicazione Fogliare

FECUNDATOR	**1,5 L./ha.**
ALGATRON	**0,75 L./ha.**
EDYMAG	**0,75 L./ha.**
MELASTOP	**0,3 L./ha.**

NOTA. *Nel caso di varietà soggette a questa alterazione, eseguire il trattamento all'inizio della fioritura.*

EDYPRO
biotecnologia

FECUNDATOR corregge il comportamento vegetativo generato dallo *"spostamento del fiore nel grappolo"*. Aumenta la produzione, riducendo al minimo il numero di frutti abortiti.

2º Trattamento per l'Allegagione

1 settimana dopo il 1º trattamento

Applicazione Fogliare

FECUNDATOR	**1,5 L./ha.**
CENICIENTA	**4 L./ha.**
ENDOFOSTEC	**0,75 L./ha.**
ZIMA-L MAX	**0,75 L./ha.**
EDYMAG	**0,4 L./ha.**
MELASTOP	**0,3 L./ha.**

EDYPRO
biotecnologia

GESTITO CON L'USO DELLA Biotecnologia di EDYPRO

La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

EDYPRO
biotecnologia

Trattamento per prevenire le infezioni da Oidio

Applicazione Fogliare

<u>1ª applicazione</u>: quando le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione:

CENICIENTA	**4 L./ha.**
MELASTOP	**0,3 L./ha.**

ripetere il trattamento dopo 7 giorni.

Trattamento per l'Accrescimento

Con **MAX QUALITY** influenziamo **il genoma della pianta** stimolando l'accumulo di carboidrati nei frutti nel processo di accrescimento e di conseguenza otteniamo grappoli di alto calibro standard, con **alto contenuto di succo e caratteristiche organolettiche eccezionali**.

EDYPRO
biotecnologia

Trattamento per l'Accrescimento

Applicazione Fogliare

1ª applicazione: all'inizio dell'accrescimento:

MAX QUALITY	**1,5 L./ha.**
CENICIENTA	**4 L./ha.**
HYDROCAL	**0,75 L./ha.**
ZIMA-L MAX	**0,4 L./ha.**
EDYMAG	**0,4 L./ha.**
MELASTOP	**0,3 L./ha.**

2ª applicazione: ripetere il trattamento dopo 15-20 giorni.

EDYPRO
biotecnologia

GESTITO CON L'USO DELLA Biotecnologia di EDYPRO

La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

Trattamento per la Maturazione

MADUR FRUIT è un prodotto che influisce sui processi fisiologici di maturazione e finitura dei grappoli. La sua applicazione esalta il cambiamento di colore nelle buccia del grapolo, **intensificando la colorazione del vino**.

Allo stesso tempo ha un impatto molto positivo sui **fattori di qualità interna del grappolo** (aromi, gradi Brix, ecc.), intensificando notevolmente la qualità del vino in cantina.

EDYPRO
biotecnologia

Trattamento per la Maturazione

Applicazione Fogliare

1ª applicazione rializare nella seconda metà di luglio:

MADUR FRUIT	**2,5 L./ha.**
HYDROCAL	**1 L./ha.**
BOTCAR	**1 L./ha.**
ZIMA-L MAX	**0,4 L./ha.**
MELASTOP	**0,3 L./ha.**

2ª applicazione 4 settimane dopo la prima applicazione:

MADUR FRUIT	**2,5 L./ha.**
BOTCAR	**1 L./ ha.**
MELASTOP	**0,3 L./ha.**

EDYPRO
biotecnologia

GESTITO CON L'USO DELLA Biotecnologia di EDYPRO

La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.